

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
**РиниКолд КОФКОМПЛЕКС®**

**Регистрационный номер:** ЛС-001244

**Торговое наименование:** РиниКолд КОФКОМПЛЕКС®

**Группировочное наименование:** Амброксол + Гвайфенезин + Фенилэфрин + Хлорфенамин

**Лекарственная форма:** сироп

**Состав на 10 мл сиропа:**

Амброксола гидрохлорид	15.00 мг
Хлорфенамина малеат	2.0 мг
Фенилэфрина гидрохлорид	5.0 мг
Гвайфенезин	100.0 мг

*Вспомогательные вещества:* сахароза 4000,00 мг, метилпарагидроксибензоат 18,00 мг, пропилпарагидроксибензоат 2,00 мг, динатрия эдетат 2,00 мг, сорбитол 70% раствор 1000,00 мг, глицерин (глицерол) 500,00 мг, ментол 1,00 мг, лимонная кислота 2,00 мг, натрия цитрат 5,00 мг, ароматизатор дыни 0,03 мл, краситель солнечный закат желтый [E110] 0,66 мг, вода очищенная q.s. до 10 мл.

**Описание**

Густой раствор от светло-оранжевого до оранжевого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство для устранения симптомов ОРЗ и «простуды».

**Код АТХ:** N02BE51

**Фармакологическое действие**

РиниКолд КОФКОМПЛЕКС® - сироп – комбинированный препарат, входящие в его состав гвайфенезин и амброксол снижают вязкость бронхиального секрета и облегчают отхаркивание. Хлорфенамина малеат оказывает противоаллергическое действие: устраняет слезотечение, зуд в глазах и носу. Фенилэфрина гидрохлорид оказывает сосудосуживающее действие, уменьшает отечность и гиперемию слизистых оболочек верхних отделов дыхательных путей и придаточных пазух.

**Показания к применению**

Симптоматическое лечение «простудных» заболеваний, гриппа и ОРВИ, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой вязкой мокротой.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, одновременный прием других препаратов, содержащих вещества входящие в состав РиниКолд КОФКОМПЛЕКС®, одновременный прием трициклических антидепрессантов, ингибиторов моноаминоксидазы, бета-адреноблокаторов, судороги любой этиологии, выраженный атеросклероз коронарных артерий, артериальная гипертензия, сахарный диабет, тиреотоксикоз, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, аденома предстательной железы, дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период лактации, детский возраст (до 6 лет).

**С осторожностью** – почечная и/или печеночная недостаточность, детский возраст до 12 лет.

## **Способ применения и дозировка:**

*Перед применением взбалтывать!*

*Рекомендуемая доза для взрослых и детей старше 12 лет:*

20 мл (4 чайные ложки) 3 раза в день

*Рекомендуемая доза для детей 6 – 12 лет:*

10 мл (2 чайные ложки) 2 – 3 раза в день

Прием препарата следует равномерно распределить в течение всего дня.

## **Побочное действие**

Возможны подъем артериального давления тахикардия, головная боль, появление сонливости, головокружение, сухость слизистых оболочек, ухудшение аппетита, затруднение мочеиспускания, аллергические реакции в виде сыпи и зуда, крапивницы, отека Квинке; тошнота, рвота, запор, диарея, боли в эпигастральной области, повышенная возбудимость, нарушение засыпания, мидриаз, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, феохромоцитома.

У детей возможно возникновение возбуждения, беспокойства и раздражительности.

У пожилых пациентов возможны также спутанность сознания или раздражительность.

## **Передозировка**

Усиление выраженности побочных эффектов. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, слабительные средства (вазелиновое масло, солевые слабительные); симптоматическая терапия. При выраженных нарушениях необходимо обратиться к врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Препарат усиливает действие седативных средств, этанола. Совместное применение с антидепрессантами, фенотиазиновыми производными (хлорпромазин, трифлуоперазин, левомепромазин), противопаркинсоническими и антипсихотическими средствами повышает риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров, с глюкокортикостероидами (преднизолон, дексаметазон, триамцинолон) увеличивает риск развития глаукомы. Хлорфенамин при применении одновременно с ингибиторами моноаминоксидазы (ниаламид), фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению, гиперпирексии. Применение совместно с трициклическими антидепрессантами усиливает их симпатомиметическое действие, с галотаном повышает риск развития желудочковой аритмии, с гуанетидином снижает его гипотензивное действие, который, в свою очередь, усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина. Одновременное применение амброксола и гвайфенезина с противокашлевыми средствами приводит к затруднению отхождения мокроты.

### **Особые указания**

Не рекомендуется прием препарата более 7 дней без назначения врача.

Возможно окрашивание мочи в розовый цвет.

Препарат следует с осторожностью применять у пациентов с ослабленным кашлевым рефлексом или нарушенным мукоцилиарным транспортом из-за возможности скопления мокроты.

Во время лечения рекомендуется принимать достаточное количество жидкости.

Гвайфенезин входящий в состав препарата, может давать ложноположительные результаты при определении 5-гидроксииндолуксусной и винилилминдальной кислот в моче вследствие влияния метаболитов гвайфенезина на цвет (прием гвайфенезина следует прекращать за 48 ч до сбора мочи для данного теста).

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

При приеме препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

#### **Сироп от кашля.**

Первичная: по 100 мл в стеклянные флаконы темного стекла, укупоренные навинчивающейся металлической крышкой с контролем первого вскрытия.

Вторичная: по одному флакону в картонную пачку вместе с инструкцией по применению

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (флакон в пачке).

Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Наименование и адрес компании держателя/владельца регистрационное удостоверение:**

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.».

Шрея Хауз, 301/А, Перейра Хилл Роуд, Андхери (Ист), Мумбаи - 400 099, Индия.

**Производитель**

«Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд.».

Уч.13, 14 и 15, Вилладж: Райпур, ПО. Бхагванпер, Рурки-247 661, Дист. Харидвар, Уттаракханд, Индия.

**Организация, принимающая претензии потребителей**

*Представительство Компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» в РФ:*

111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

Тел. +7 (495) 970-15-80

Е-mail: [info@shreya.ru](mailto:info@shreya.ru)